


ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО АЧС




ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
в Кіровоградській області

Як передається



Через залишки їжі, які згодуються свинопоголів'ю інфіковані продукти забою



Через прямий контакт з хворими домашніми або дикими свинями

Через трупи інфікованих свиней



Через забруднені речі (взуття, одяг)



Як запобігти занесенню вірусу АЧС

- Перед входом у свинарник покладіть (в розрізану пластикову каністру) килимок (краще поролоновий), який регулярно змочуйте дезінфікуючим засобом (наприклад, добре підійде «Білизна», універсальний чистячий засіб тощо)
- не утримуйте в одному приміщенні зі свинопоголів'ям інших тварин чи птицю, особливо, якщо вони виходять надвір
- щодня оглядайте свиней. Якщо виникла підозра, що вони захворіли, обов'язково повідомте ветеринарного лікаря
- не пускайте у свинарник сторонніх людей


Симптоми

Ознаки захворювання проявляються у свиней через 10-12 діб після зараження

- Висока температура 40-42°C

- Кінцівки (ніс, вуха, хвіст і гомілки) стають ціанотичними (синьо-фіолетового кольору)

- Коматозний стан і смерть протягом кількох днів



Людині вірус АЧС не передається

У випадку підтвердження хвороби все свинопоголів'я підлягає умертвленню, що призводить до значних економічних збитків. Лише суворе дотримання правил біобезпеки допоможе зберегти свинопоголів'я!

